TelessaúdeRS

Segunda Opinião Formativa

Quais as possíveis intervenções que posso empregar no manejo de paciente com hábitos de sucção digital e uso de chupeta?

Área temática: Saúde da Criança

Descritores: Chupeta; Sucção

Intervenções em pacientes com hábito de sucção não nutritiva devem incluir o controle de eventuais fontes de estresse e ansiedade na vida da criança, uso de aparelho intrabucal fixo com grade palatina, reforço positivo e reforço negativo, e descontinuação dos comentários dos pais sobre o hábito, nos casos onde esse ato parece reforçar o comportamento. A literatura aponta ainda que a intervenção deve ser feita preferencialmente até os três (03) anos de idade.

Referências

CORRÊA, M. S. N. P.; DISEENHA, R. M. S.; WEFFORT, S. Y. K. **Saúde bucal do bebê ao adolescente**: guia de orientação. São Paulo: Santos, 2005.

MARTINS, B. S. et al. Métodos usados para remoção dos hábitos de sucção de dedo e/ou chupeta em crianças do minicípio de Mutum-MG. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research**, Vitória, v. 12, n. 4, p. 19-25, 2011.

NOWAJ, A. J.; WARREN, J. J. **Oral habits and orofacial development in children**. Waltham (MA): UpToDate, 2017. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/oral-habits-and-orofacial-development-in-children>. Acesso em: 18 Dez. 2017.