

## Condutas dos profissionais da Atenção Básica:

- Estabeleçam a cobertura do exame colpocitológico por meio do planejamento local da UBS;
- Identifiquem a população feminina na área adscrita da ESF;
- Identifiquem as mulheres do grupo de risco (mulheres com vida sexual ativa em qualquer idade e, em especial, mulheres com idade entre 25 e 59 anos);
- Sensibilizem a população e, sobretudo, as mulheres para a necessidade da realização do exame;
- Estimulem a captação das mulheres pelo ACS e o encaminhamento ao Centro de Saúde para exame;
- Estabeleçam a livre demanda ou agendamento prévio para coleta e entrega do resultado;
- Realizem orientações prévias, preferencialmente por escrito, para a coleta adequada do exame;
- Façam a busca ativa e seguimento das mulheres com alterações que necessitam de tratamentos e encaminhamentos para especialidades.
- Lembre-se: não está contraindicada a realização do exame em mulheres grávidas, pode ser feito em qualquer período da gestação, preferencialmente, até o 7º mês de gestação. Deve-se realizar apenas a coleta da Ectocervice.

## Recomendações prévias para a realização da coleta de exame colpocitológico que devem ser fornecidas às mulheres:

- Não utilizar duchas ou medicamentos vaginais.
- Não ter realizado ultrassonografia transvaginal nas últimas 48 horas.
- Evitar relações sexuais com penetração vaginal durante 48 horas antes da coleta.
- Aguardar o 5º dia após o término da menstruação.