

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

Grupo Alvo	Idade	BCG	Tríplice Viral	Tetra viral***	Penta	Hepatite A**	Hepatite B	Dupla Adulto	dTpa****	Meningocócica C (conjugada)*	Pneumocócica 10V (conjugada)*	Rotavírus Humano	HPV	Febre Amarela	VIP/VOP
Crianças	Ao nascer	Dose única					Dose ao nascer								
	2 meses				1ª dose						1ª dose	1ª dose			1ª dose (com VIP)
	3 meses									1ª dose					
	4 meses				2ª dose						2ª dose	2ª dose			2ª dose (com VIP)
	5 meses									2ª dose					
	6 meses				3ª dose										3ª dose (com VIP)
	9 meses													Uma dose	
	12 meses		1ª dose							Reforço	Reforço				
	15 meses			Uma dose	1º reforço (com DTP)	Uma dose (15 meses até 23 meses)									1º reforço (com VOP)
	4 anos				2º reforço (com DTP)										2º reforço (com VOP)
	9 anos														
	10 a 19 anos		2 doses (a depender da situação vacinal)				3 doses (a depender da situação vacinal)	Reforço a cada (10 anos)		01 reforço ou dose única (verificar situação vacinal - 12 a 13 anos)			2 doses (meninas de 9 a 14 anos) 2 doses (meninos de 11 a 14 anos)	Verificar situação vacinal	
Adulto	20 a 59 anos		2 doses (20 a 29 anos) 1 dose (30 a 49 anos) Verificar situação vacinal anterior.				3 doses (a depender da situação vacinal)	Reforço a cada (10 anos)						Verificar situação vacinal	
Idoso	60 anos ou mais						3 doses (a depender da situação vacinal)	Reforço a cada (10 anos)						Verificar situação vacinal. Em situação de risco de contrair a doença, o médico deverá avaliar o benefício/risco de vacinação.	
Gestante							3 doses (a depender da situação vacinal)	3 doses (a depender da situação vacinal)	Uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana						

\*Administrar Uma dose da vacina Pneumocócica 10V (conjugada) e da vacina Meningocócica C (conjugada) em crianças entre 2 e 4 anos, que não tenham recebido o reforço ou que tenham perdido a oportunidade de se vacinar anteriormente.

\*\*Administrar Uma dose da vacina hepatite A, em crianças entre 2 e 4 anos, que tenham perdido a oportunidade de se vacinar anteriormente.

\*\*\*A vacina tetra viral corresponde à segunda dose da tríplice viral e à dose da vacina varicela. Crianças entre 2 e 4 anos que não apresentarem nenhuma dose da vacina com componente varicela, poderão receber Uma dose.

\*\*\*\*Gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante o período gestacional, administrar uma dose de dTpa no puerpério, o mais precocemente possível. A vacina dTpa também será oferecida para profissionais de saúde que atuam em maternidade e em unidade de internação neonatal (UTI/UCI convencional e UCI canguru), atendendo recém-nascidos e crianças menores de 1 ano de idade.

**Fonte:** BRASIL. Portaria nº 1.533, de 18 de agosto de 2016. Redefine o Calendário Nacional de Vacinação, o Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas Nacionais de Vacinação, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo o território nacional. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 ago. 2016. Seção 1, p. 55.