

Condição Atual	Anticoncepcional Oral*	Anticoncepcional Injetável		Minipílula	DIU de Cobre	Métodos de Barreira**
		Combinado (mensal)	Progestágeno (trimestral)			
HAS: com PAS>160 e PAD>=100mmHg	4	4	3	2	1	1
HAS + portadora de doença vascular	4	4	3	2	1	1
História atual de TEP/ TVP	4	4	3	3	1	1
Histórico TEP/ TVP + uso atual de anticoagulante oral	4	4	2	2	1	1
História prévia de TEP/TVP	4	4	2	2	1	1
Isquemia cardíaca (prévia ou atual)	4	4	3	2 (introdução do método 3 (manutenção do método)	1	1
AVC (prévio ou atual)	4	4	3	2 (introdução do método 3 (manutenção do método)	1	1
Dislipidemias	2/3	2/3	2	2	1	1
Diabetes há mais de 20 anos OU com doença vascular (nefro, retino ou neuropatias)	3/4	3/4	3	2	1	1
Enxaqueca sem aura (<35 anos)	2 (introdução do método 3 (manutenção do método)	2 (introdução do método 3 (manutenção do método)	2	1 (introdução do método 2 (manutenção do método)	1	1
Enxaqueca sem aura (>=35 anos)	3 (introdução do método 4 (manutenção do método)	3 (introdução do método 4 (manutenção do método)	2 (introdução do método 3 (manutenção do método)	2 (introdução do método 3 (manutenção do método)	1	1
Enxaqueca com aura	4 (introdução do método)	4 (introdução do método)	2 (introdução do método 3 (manutenção do método)	2 (introdução do método 3 (manutenção do método)	1	1
Câncer (CA) de mama atual	4	4	4	4	1	
Histórico de CA de mama - ausência de evidência por 5 anos	3	3	3	3	1	
Uso atual de anticonvulsivantes**	3	2	1	3	1	

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016a. Disponível em: < http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf>.

Legenda:

- A** - O DIU de cobre é **categoria 2** para mulheres com idade menor ou igual a 20 anos pelo maior risco de expulsão (maior índice de nuliparidade) e por ser faixa etária considerada de maior risco para contrair IST.
- B** - Ainda não há riscos demonstrados para o feto, para a mulher ou para a evolução da gestação nesses casos quando usados **acidentalmente** durante a gravidez.
- C** - Ainda não há riscos demonstrados para o feto, para a mulher ou para a evolução da gestação nesses casos quando usados **acidentalmente** durante a gravidez, **MAS** ainda não está definida a relação entre o uso do acetato de medroxiprogesterona na gravidez e os efeitos sobre o feto.
- D** - O DIU de cobre é **categoria 1** se: **a)** For introduzido em menos de 48 horas do parto, com ou sem aleitamento, desde que não haja infecção puerperal (cat. 4); **b)** For introduzido após quatro semanas do parto.
- E** - O DIU de cobre é **categoria 3** se introduzido entre 48 horas e quatro semanas após o parto.
- F** - **Categoria 4** para colocação de DIU de cobre em casos de DIP atual, cervicite purulenta, clamídia ou gonorreia.
- G** - Em quaisquer casos, inclusive DIP atual, o DIU de cobre é **categoria 2**, se o caso for continuação do método (usuária desenvolveu a condição durante sua utilização), ou se forem outras IST que não as listadas na letra.

Notas:

- * Anticoncepcionais com dose menor ou igual a 35 mcg de etinilestradiol.
- ** Diargma, preservativo masculino, feminino e espermicida.
- *** Anticonvulsivantes: fenitoína. carbamazepina, topiramato, oxcarbazepina, barbitúricos, primidona. Não entra nessa lista o ácido valproico.