

Medicamentos, apresentações comerciais (algumas), via de administração, armazenamento para os portadores da doença renal crônica.

Medicamentos	Apresentações comerciais	Via de administração	Armazenamento
Eritropoietinas sintéticas 4.000 UI 2.000 UI	Alfapoetina Hemax®	Subcutânea preferencialmente Pode ser administrado intravenosa	Termolábil (2 a 8°C). Em refrigerador.
Sacarato de hidróxido de ferro 100 mg	Sucrofer® Noripurum®	Via intravenosa	Temperatura não superior a 25°C. Não congelar.
Calcitriol 0,25 mcg	Ostriol® Sigmatril®	Via oral	Temperatura entre 15 a 30°C, proteger da luz.
Calcitriol 1 mcg	Calcigex®	Via intravenosa	Temperatura entre 15 a 30°C.
Desferroxamina 500 mg	Desferal®	Intravenosa Intramuscular Subcutânea	Temperatura ambiente entre 15 a 30°C.
Sevelamer 800 mg	Renagel®	Via oral	Temperatura entre 15 a 30 °C, protegido da umidade.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Portaria Nº 845, de 31 de outubro de 2002. Aprovar o PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - HIPERFOSFATEMIA NA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA - Carbonato de Cálcio, Acetato de Cálcio, Hidróxido de Alumínio, Cloridrato de Sevelamer, na forma do Anexo desta Portaria. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 nov. 2002.