




Prezado aluno,
Este fluxograma tem como objetivo apresentar as etapas que facilitarão o atendimento de pacientes com doença renal (ou que pertencem a grupos de risco) e quadro de dor aguda.

CRISE DOLOROSA AGUDA NO PACIENTE COM DOENÇA RENAL E GRUPOS DE RISCO

ESCALA VISUAL ANALÓGICA - EVA



Dor leve

Dipirona 500 mg a 1 g via oral
ou
Paracetamol 500 a 750 mg via oral

Se houver necessidade de usar via endovenosa:
Dipirona 1 g endovenosa

Dor moderada

Dipirona 1 g endovenosa
(pode-se utilizar até 2 g a critério médico)

Melhora após 20 a 30 minutos
do término da infusão?

não

Tramadol 100 mg endovenosa

Melhora após 20 a 30 minutos
do término da infusão?

não

Dor intensa

Dipirona 1 g endovenosa
(pode-se utilizar até 2 g a critério médico)
+
Tramadol 100 mg endovenosa

Melhora após 20 a 30 minutos
do término da infusão?

não

Morfina 10 mg em 9 mL de água destilada: aplicar 2 a 3 mL endovenosa a cada 5 a 10 minutos, observando a resposta clínica e efeitos colaterais como sedação excessiva, depressão respiratória e hipotensão.

DURANTE TODO O ATENDIMENTO DO PACIENTE COM DOR, VERIFICAR A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E DO SERVIÇO SOCIAL

*obs: Sempre que possível, evitar o uso de anti-inflamatórios nos pacientes com DRC, especialmente naqueles em tratamento conservador, dialíticos com função renal residual (diurese > 200 mL/24h), idosos e desidratados.