



Alteração ou perda da consciência

Quando um paciente acusa estar “passando mal” e evolui para o estado de inconsciência, as manobras iniciais de pronto atendimento são essencialmente as mesmas. Elas tem por objetivo principal a manutenção das vias aéreas livres e das condições respiratórias e circulatórias.



Alteração ou perda da consciência

Lipotimia e Síncope

Significado e Risco Clínico

Lipotimia X Síncope

Alteração ou perda da consciência

Síncope

Ocorrência

Síncope Vasovagal

Alteração ou perda da consciência

Prevenindo

Síncope

Ansiedade

Médico

Alimentação

Estímulos visuais

Anestesia

Expressões

Alteração ou perda da consciência

Protocolo de Atendimento

Síncope

Interrompa o atendimento;

Libere a passagem de ar;

Recline a cadeira;

Monitorize pulso e respiração;

Aguarde 2 a 3 minutos para que haja melhora do mal estar;

Aguarde a recuperação de 10 a 15 minutos;

Investigue a causa, para prevenir sua recorrência.

Alteração ou perda da consciência

Significado e Risco Clínico

Hipoglicemia

Quando o paciente apresenta níveis de glicose mínimos no sangue, abaixo de 60 mg/dL.

Alteração ou perda da consciência

Hipoglicemia

Ocorrência

Excesso de bebida

Jejum

Uso de medicamentos

Diabetes tipo I

Alteração ou perda da consciência

Hipoglicemia

Prevenindo

História

Jejum

Hemoglobina Glicada

Consultas

Alteração ou perda da consciência

Hipoglicemia

Protocolo de atendimento

Paciente Responsivo

Paciente Inconsciente

Coloque-o em posição confortável;

Administre carboidratos por via oral até o desaparecimento dos sintomas;

Aguarde de 20 a 30 minutos;

Investigue a causa.

Alteração ou perda da consciência

Hipoglicemia

Protocolo de atendimento

Paciente Responsivo

Chame o SAMU;
Libere vias aéreas;
Coloque açúcar sob a língua;

Paciente Inconsciente

Verifique o pulso;
Aguarde o socorro;
Referencie para avaliação médica.

Alteração ou perda da consciência

Significado e Risco Clínico

Hipotensão ortostática

Caracterizada por uma diminuição brusca da pressão arterial que pode ocorrer quando o paciente deitado assume rapidamente a posição em pé, ficando sujeito a síncope.

Alteração ou perda da consciência

Ocorrência

Hipotensão ortostática

Causa mais comum é a hipovolemia devido ao uso abusivo de diuréticos, ou associado a medicamentos vasodilatadores.

Além disso:

Idade, defeitos venosos nas pernas, gravidez e paciente deitado por muito tempo são fatores de risco.

Alteração ou perda da consciência

Prevenindo

Hipotensão ortostática

Deve ser feita anamnese com perguntas como:

- Tem tomado alguma medicação de forma contínua nos últimos dois anos?
- Já desmaiou ou teve convulsões?

Alteração ou perda da consciência

Prevenindo

Hipotensão ortostática

Levante o encosto da cadeira de forma gradual e peça para o paciente aguardar.

Alteração ou perda da consciência

Protocolo de Atendimento

Hipotensão ortostática

Chacoalhe o paciente tentando reanimá-lo;

Deite a cadeira fazendo com que os pés fiquem acima do nível da cabeça;

Avalie a respiração e o pulso.