

Achado	Leve	Moderada	Grave	Muito grave
DISPNEIA	Caminhando Pode deitar	Conversando Prefere sentar	Em repouso crianças em aleitamento para amamentação	Em repouso
FALA	Sentenças	Frases	Palavras	
ESTADO MENTAL	Normal	Agitado	Agitado	Confuso
FR*	Normal	Aumentada	Aumentada	> 30 (adultos)
Ver parâmetros no início do capítulo				
MUSCULATURA ACESSÓRIA	Geralmente não	Retração intercostal leve ou ausente	Retrações subcostais e/ou esternocleidomastoideas acentuadas	Retrações acentuadas ou em declínio (exaustão)
PULSO/min	<100	100-120	>120	>120
FC: 2-12meses < 160/min; 1-2 anos < 120/min; 2-8 anos < 110/min				
PFE após $\beta_2$	> 80%	60%-80%	< 60%	
Saturação O <sub>2</sub>	> 95%	91%-95%	< 90%	
PaO <sub>2</sub>	normal	> 60mmHg	< 60mmHg	
PaCO <sub>2</sub>	< 45mmHg	< 45mmHg	> 45mmHg	

Fonte: (GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA AND PREVENTION, 2007; CONSENSO BRASILEIRO DE ASMA IV, 2006).