



Segunda Opinião Formativa (SOF)

Quais são as diferenças entre os sintomas da dengue e da febre amarela?

Área temática: sinais e sintomas

DeCS/MeSH: [Dengue \(D1\)](#), [Febre Amarela \(D1\)](#), [Sinais e Sintomas](#)

Inicialmente, os sinais e sintomas da dengue e da febre amarela são muito semelhantes. Ambas podem cursar com dor de cabeça, febre alta, dor no corpo, cansaço, náuseas e vômitos. Manifestações hemorrágicas (sangramento gengival, petéquias, etc) também podem ocorrer tanto na dengue como na febre amarela.

Na dengue, geralmente destaca-se a forte dor retro-ocular. Na febre amarela, cerca de 15% dos casos evoluem com aparecimento de icterícia (“amarelão”); por isto o nome da doença.

Outro ponto a ser levado em consideração para diferenciar febre amarela e dengue é o aspecto epidemiológico. Para isso é importante saber se o paciente:

- vive ou viajou para região que tem apresentado casos de dengue?
- frequentou mata de regiões de risco para febre amarela?

Importante destacar que, na presença de sinais e sintomas suspeitos de qualquer uma das doenças, o paciente deve ser

orientado a procurar rapidamente serviço médico para avaliação. Através da história clínica e dados epidemiológicos do caso, o médico até poderá descartar a suspeita de dengue ou febre amarela, no entanto a confirmação só será dada através de exames laboratoriais específicos.

Bibliografia Selecionada

1. Vasconcelos PFC, Toscano CM. Febre amarela. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, eds. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2004. p. 1511-9.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Programa nacional de controle da dengue [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2009 [citado 2009 Ago 12]. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/SAUDE/area.cfm?id_area=920
3. Brasil. Ministério da Saúde. Febre amarela [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2009 [citado 2009 Ago 12]. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/index.php>