

Manifestações Clínicas e Conduta – Acidente por Caravelas e Água-Viva		
Manifestação	Sintomas	Conduta
Local	Dor Placas e pápulas urticariformes lineares Flictenas e necrose	Analgesia (dipirona / paracetamol); Anti-histamínico (loratadina / dexclorfeniramina/ prometazina); Corticoide tópico (dexametasona); Corticoide oral (prednisona)
Decorrente de Ingestão	Sintomas gastrointestinais alérgicos Quadro urticariforme	Anti-histamínico (loratadina / dexclorfeniramina / prometazina); Corticoide oral (prednisona); Antiemético (metoclopramida)
Grave	Cefaleia Náusea e Vômitos Espasmos Musculares Febre Arritmia	Analgesia (dipirona/ paracetamol) Antiemético (metoclopramida) Corticoide (hidrocortisona/ prednisona) Suporte clínico em unidade de urgência e emergência
Sistêmica	Anafilaxia (cefaleia, vertigem, dispneia, broncoespasmo, agitação psicomotora, prurido generalizado, urticária, angioedema, hipotensão, dor abdominal)	Adrenalina Broncodilatador (salbutamol) Analgesia (dipirona/ paracetamol) Anti-histamínico (loratadina/ dexclorfeniramina/ prometazina) Corticoide (hidrocortisona/ prednisona) Expansão de volume (Solução salina/ Ringer lactato) Suporte clínico em unidade de urgência e emergência