

Manifestações Clínicas e Conduta – Soroterapia		
Manifestação	Sintomas	Conduta
Precoce Leve	Urticária; Tremor; Tosse; Náusea e Vômitos; Dor abdominal; Prurido; Rubor facial	Analgesia (dipirona/ paracetamol); Antiemético (metoclopramida); Anti-histamínico (loratadina/ dexclorfeniramina/prometazina); Corticoide (prednisona/hidrocortisona); Observação por 24 horas
Precoce Grave	Anafilaxia (cefaleia, vertigem, dispneia, broncoespasmo, agitação psicomotora, prurido generalizado, urticária, angioedema, hipotensão, dor abdominal)	Suspender a infusão da soroterapia Adrenalina Broncodilatador (salbutamol) Analgesia (dipirona/ paracetamol) Anti-histamínico (loratadina/ dexclorfeniramina/ prometazina) Corticoide (hidrocortisona/ prednisona) Expansão de volume (Solução salina/ Ringer lactato) Após controle da reação anafilática reiniciar soroterapia com soro diluído e infusão mais lenta
Tardia Doença do Soro (5 a 24 dias após soroterapia)	Febre Artralgia Linfonodomegalia Urticária Proteinúria	Analgesia (dipirona/ paracetamol) Corticoide oral (prednisona)