

Manifestações Clínicas e Conduta – Acidente por Abelhas		
Manifestação	Sintomas	Conduta
Local (Início rápido e duração de minutos a horas/dias)	Dor aguda Hiperemia Prurido Edema	Analgesia (dipirona / paracetamol) Anti-histamínico (loratadina / dexclorfeniramina / prometazina)
Regional (Início lento 24-48h e duração de dias)	Prurido Eritema Edema flogístico com endureção local	Analgesia (dipirona / paracetamol) Anti-histamínico (loratadina / dexclorfeniramina / prometazina) Corticoide oral (prednisona)
Sistêmica (Início rápido após ferroadada)	Anafilaxia (cefaleia, vertigem, dispneia, broncoespasmo, agitação psicomotora, prurido generalizado, urticária, angioedema, hipotensão, dor abdominal)	Adrenalina Broncodilatador (salbutamol) Analgesia (dipirona/ paracetamol) Anti-histamínico (loratadina/ dexclorfeniramina/ prometazina) Corticoide (hidrocortisona/ prednisona) Expansão de volume (Solução salina/ Ringer lactato) Suporte clínico em unidade de urgência e emergência
Tardia (Início diversos dias após a ferroadada)	Artralgia Febre Encefalite	Analgesia (dipirona/ paracetamol) Corticoide (hidrocortisona/ prednisona)
Síndrome do Envenenamento (Quadro tóxico generalizado)	Sintomas locais Sintomas Regionais Sintomas Sistêmicos Hemólise intravascular Hipotensão arterial Oliguria / Anuria Insuficiência Renal Aguda	Adrenalina Broncodilatador (salbutamol) Analgesia (dipirona/ paracetamol) Anti-histamínico (loratadina/ dexclorfeniramina/ prometazina) Corticoide (hidrocortisona/ prednisona) Expansão de volume (Solução salina/ Ringer lactato) Suporte clínico em unidade de urgência e emergência