



Especialização em Saúde da Família - Modalidade a Distância

Avaliação Neurológica - Reflexos



O que Examinar	Como examinar	Achados
Reflexo de sucção	A estimulação se faz com um toque no rosto (região perioral) com o dedo	O comportamento compreende virar a cabeça em direção à fonte de estímulo, abrir a boca, com movimentos de sucção. A cessação se dá por volta dos 6 a 8 meses.
Reflexo de Moro	A estimulação se faz com estímulo: com uma súbita mudança de equilíbrio e barulho estridente	O comportamento compreende estender os braços, pernas e dedos, curvar-se, jogar a cabeça para trás (abraço). A cessação se dá por volta dos 6 meses.
Reflexo de preensão palmar	A estimulação se faz com cócegas na palma da mão	Agarra fortemente o dedo. A cessação se dá por volta dos 4 meses.
Reflexo de Babinski	A estimulação se faz através de cócegas na planta do pé.	Os artelhos se abrem em leque, o pé vira para dentro. A cessação se dá aproximadamente aos 6 a 9 meses.
Reflexo de marcha	A estimulação se faz segurando a criança sob o braço, com os pés descalços, tocando uma superfície plana.	Apresenta um caminhar coordenado. A cessação se dá por volta dos 3 meses.
Reflexo Tônico cervical	O estímulo se faz com a rotação da cabeça da criança para um dos lados.	Comportamento – o bebê assume a posição de esgrimista. A cessação se dá por volta dos 3 meses.
Reflexo de Galant	Friccionar o dorso vertebralmente com o dedo ou cotonete.	Comportamento – a criança forma com o corpo um arco,

		apresentando a concavidade voltada na direção do estímulo, e a bacia é puxada para cima. A perna e o braço do mesmo lado estendem-se, as extremidades opostas fletem-se. Cessação se dá por volta dos 2 meses
Reflexo de preensão plantar	A estimulação se faz tocando a planta do pé, abaixo dos artelhos.	Agarra fortemente com os artelhos. A cessação se dá por volta dos 4 meses.
Reflexo de Landau I	Coloca-se a mão sobre o abdome, suspendendo a criança no ar (suspenda horizontalmente).	Trata-se do resultado de uma complexa interação de reações labirínticas e tônico-cervicais. Comportamento: ocorre espontaneamente a movimentação da cabeça, suspendendo ou estendendo-a juntamente com a extensão das pernas. Começa a evidenciar-se a partir dos 3 meses. Cessa depois dos 12 meses.
Reflexo Landau II	Na mesma posição anterior, flexiona-se a cabeça para baixo.	Comportamento: flexão das pernas. Aparece aos 3 meses e desaparece ao longo do 2º. Ano.

Fonte: Brêtas, José Roberto da Silva; Quirino, Marinalva Dias; Silva, Conceição Vieira da; Sabatés, Ana Llonch; Ribeiro, Circéa Amália; Borba, Regina Issuzi Hirooka de; Almeida, Fabiane de Amorim. **Manual de Exame Físico para a prática de enfermagem em pediatria** – São Paulo: Iátria editora. 2005. 187p. p.105 e 106.