

## Qual o intervalo máximo para aplicação de enantato de noretisterona + valerato de estradiol injetável mensal (Mesigyna<sup>®</sup>, Noregyna<sup>®</sup>)?

Área temática: Apoio ao Tratamento

Descritores: Medicamentos; Saúde Sexual; Saúde da Mulher

A combinação injetável de enantato de noretisterona 50 mg/mL + valerato de estradiol 5 mg/mL deve ser administrada a cada 30 dias, com intervalo máximo de até 33 dias, independente da menstruação.

O injetável combinado mensal induz sangramento a partir do 22º dia, porém podem ocorrer irregularidades menstruais e amenorreia com o seu uso, por isso não se deve esperar o próximo ciclo (menstruação) para administração do anticoncepcional injetável.

Quando o intervalo entre as doses exceder 33 dias, é necessário excluir a hipótese de gestação com um teste de gravidez e um método contraceptivo adicional deverá ser utilizado durante 7 dias após a administração do anticoncepcional. Se ocorrer suspeita de gravidez, mesmo com um teste de gravidez negativo, o teste deve ser repetido em uma semana.

(Cadernos de Atenção Básica, n. 26).

Disponível

em: <<http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab26>>.

Acesso em: 13 set. 2017.

MESIGYNA<sup>®</sup>: solução injetável. Orizaba: Bayer de México, 2013. Bula de remédio.

Disponível em:

<[http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila\\_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=10926102013&pIdAnexo=1919347](http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=10926102013&pIdAnexo=1919347)>. Acesso

em: 13 set. 2017.

PASSOS, E. P. et al. **Rotinas em ginecologia**. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

### Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Formulário Terapêutico Nacional 2010: RENAME** 2010. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde sexual e saúde reprodutiva**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. p. 161.