TelessaúdeRS

Segunda Opinião Formativa – 06/06/2016

Novas Recomendações: Qual é o tratamento alternativo para sífilis primária na impossibilidade do uso de penicilina?

Área temática: Apoio ao Tratamento

Descritores: Doenças Bacterianas Sexualmente Transmissíveis; Doxiciclina; Sífilis;

O tratamento para sífilis primária ou sífilis adquirida recente (menos de um ano de evolução), em pacientes não gestantes, pode ser feito com Doxiciclina 100 mg, via oral, de 12/12 horas por 15 dias ou Ceftriaxona 1 g, intramuscular ou intravenoso, 1 vez ao dia, por 8 a 10 dias.

Esses medicamentos apresentam menor eficácia e só devem ser utilizados quando houver histórico de alergia à penicilina ou, mais recentemente, na falta de penicilina, exigindo assim maior vigilância. Devido à possibilidade de falha terapêutica, o acompanhamento com solicitação de VDRL deve ser feito a cada 60 dias. As parcerias sexuais sempre devem realizar testes imunológicos e receber tratamento, de preferência na mesma oportunidade, mesmo que apresentem testes não reagentes.

Para o tratamento de sífilis tardia, o tratamento pode ser feito com Doxiciclina 100 mg, de 12/12 horas, por 30 dias ou Ceftriaxona 1 g, intramuscular ou intravenoso, 1 vez ao dia, por 8 a 10 dias.

As gestantes com história comprovada de alergia à penicilina devem ser dessensibilizadas, pois os tratamentos não penicilínicos são inadequados na gestação. Na impossibilidade, deve ser administrada a Ceftriaxona, pois o uso de Doxiciclina é contraindicado na gestação. No entanto, nesses casos o feto será considerado não tratado. As gestantes devem ser acompanhadas com VDRL mensal até o parto.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis.** Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais.** Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

HICKS, C. B.; CLEMENT, M. **Syphilis: Treatment and monitoring**. Waltham, MA: UpToDate, 2016. Disponível em: <www.uptodate.com/contents/syphilis-treatment-and-monitoring>. Acesso em: 31 out. 2017.