

# Teste de deglutição da água

Sinais vitais prévios à oferta: FC: bpm (60 a 100 bpm) FR: rpm (12 a 20 rpm) SPO<sub>2</sub>: % (>95%)

<b>Escape oral anterior</b>	ausência 1 2 3 4 5 ml		presença 1 2 3 4 5 ml	
<b>Tempo de trânsito oral</b>	adequado 1 2 3 4 5 ml		lento 1 2 3 4 5 ml	
<b>Refluxo nasal</b>	ausência 1 2 3 4 5 ml		presença 1 2 3 4 5 ml	
<b>Número de deglutições</b>	única 1 2 3 4 5 ml		múltiplas 1 2 3 4 5 ml	ausente 1 2 3 4 5 ml
<b>Elevação laringea</b>	adequada 1 2 3 4 5 ml		reduzida 1 2 3 4 5 ml	ausente 1 2 3 4 5 ml
<b>Ausculat cervical</b>	adequada 1 2 3 4 5 ml		alterada antes e após 1 2 3 4 5 ml	alterada após a deglutição 1 2 3 4 5 ml
<b>Saturação de oxigénio</b>	linha de base ____% 1 2 3 4 5 ml		queda ____ para ____% 1 2 3 4 5 ml	
<b>Qualidade vocal</b>	adequada 1 2 3 4 5 ml	disfonia / afonia 1 2 3 4 5 ml	voz molhada clareamento espontâneo 1 2 3 4 5 ml	voz molhada clareamento voluntário 1 2 3 4 5 ml
<b>Tosse</b>	ausência 1 2 3 4 5 ml	presença: voluntária 1 2 3 4 5 ml reflexa 1 2 3 4 5 ml	presença: forte 1 2 3 4 5 ml fraca 1 2 3 4 5 ml	presença: antes 1 2 3 4 5 ml durante 1 2 3 4 5 ml após 1 2 3 4 5 ml
<b>Engasgo</b>	Ausência 1 2 3 4 5 ml		presença: rápida recuperação 1 2 3 4 5 ml	presença: recuperação com dificuldade 1 2 3 4 5 ml
<b>Outros Sinais</b>	cianose 1 2 3 4 5 ml		broncoespasmo 1 2 3 4 5 ml	alteração dos sinais vitais FC 1 2 3 4 5 ml FR 1 2 3 4 5 ml

## Teste Deglutição de Alimento Pastoso (3, 5 e 10 ml)

<b>Escape oral anterior</b>	3 5 10 ausência 3 5 10 presença	<b>Refluxo nasal</b>	3 5 10 ausência 3 5 10 presença
<b>Tempo de trânsito oral</b>	3 5 10 adequado 3 5 10 lento	<b>Resíduo em cavidade oral</b>	3 5 10 ausência 3 5 10 presença
<b>Número de deglutição</b>	3 5 10 única 3 5 10 múltiplas 3 5 10 ausente	<b>Engasgo</b>	3 5 10 ausência Presença: 3 5 10 rápida recuperação 3 5 10 recuperação com dificuldade
<b>Tosse</b>	3 5 10 ausência Presença: 3 5 10 voluntária 3 5 10 antes 3 5 10 reflexa 3 5 10 durante 3 5 10 fraca 3 5 10 após 3 5 10 forte	<b>Qualidade vocal</b>	3 5 10 adequada 3 5 10 disfonia / afonia 3 5 10 voz molhada com clareamento espontâneo 3 5 10 voz molhada com clareamento voluntário
<b>Elevação laringea</b>	3 5 10 adequada 3 5 10 diminuída 3 5 10 ausente	<b>Ausculat cervical</b>	3 5 10 adequada 3 5 10 alterada antes e após a deglutição 3 5 10 alterada após a deglutição
<b>Saturação de oxigénio</b>	3 5 10 linha de base ____% 3 5 10 queda ____ para ____%	<b>Outros sinais</b>	3 5 10 cianose 3 5 10 broncoespasmo Alteração dos sinais vitais: 3 5 10 FC 3 5 10 FR

Nível	Classificação
I	( ) Deglutição NORMAL
II	( ) Deglutição FUNCIONAL
III	( ) Disfagia orofaríngea LEVE
IV	( ) Disfagia orofaríngea LEVE A MODERADA
V	( ) Disfagia orofaríngea MODERADA
VI	( ) Disfagia orofaríngea MODERADA A GRAVE
VII	( ) Disfagia orofaríngea GRAVE
<b>Conduta:</b>	( ) Via alternativa de alimentação. ( ) Terapia fonoaudiológica. ( ) Alimentação via oral assistida pelo fonoaudiólogo.
<b>FONOAUDIÓLOGO:</b>	<b>CRFA:</b>

Figura 1. Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do Risco para Disfagia (PARD)