



Segunda Opinião Formativa – 09/11/2015

Qual a conduta diante de um resultado de exame citopatológico (CP) somente com células escamosas?

Área temática: Apoio ao Diagnóstico

Descritores: Citopatologia; Câncer do Colo do Útero; Saúde da Mulher.

O resultado de exame citopatológico (CP), com esfregaço normal somente com células escamosas não necessita de repetição imediata do exame, deve ser realizado novo CP com intervalo de um ano. Na próxima coleta, é importante tentar obter uma amostra com todos os epitélios representados. Após dois exames normais anuais consecutivos, o intervalo entre as coletas poderá ser de três anos.

Para garantir boa representação celular, o exame citopatológico deve conter amostra do canal cervical, preferencialmente, coletada com escova apropriada, e da ectocérvice, coletada com espátula tipo ponta longa (espátula de Ayre).

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Controle dos cânceres do colo do útero e da mama**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Instituto Nacional do Câncer. **Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero**. Rio de Janeiro: INCA, 2011.

GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (Org). **Tratado de medicina de família e comunidade**. Porto Alegre: Artmed, 2012. v. 2.