

Analgésicos

Na verdade, a melhor escolha é a dipirona, porque esta é mais efetiva do que o paracetamol na dor já instalada. Este é um pequeno detalhe que pode fazer a diferença no tratamento. E se no mesmo caso a dor ainda não estivesse surgido? Nesse caso, você poderia escolher um ou outro.

Observe no abaixo como usar a dipirona e o paracetamol, além dos principais efeitos colaterais.

Medicamento (genérico)	Dose (mg)	Forma farmacêutica	Intervalo de administração	Tempo de uso (média)	Efeitos colaterais
Dipirona	500	comprimidos	4/4 h	24 h	Alterações gastrointestinais, agranulocitose, alergias
Paracetamol	500	comprimidos	4/4 h	24 h	Hepatotoxicidade
Paracetamol	750	comprimidos	6/6 h	24 h	Hepatotoxicidade

Quadro 16: Analgésicos frequentemente usados em Odontologia

Fonte: Do autor (Rodrigues Filho, 2010)

Para auxiliar no controle da dor, nós temos ainda algumas associações de analgésicos. Tais associações são indicadas nas dores agudas moderadas e intensas, não responsivas a analgésicos como dipirona e paracetamol. Dentre os principais efeitos colaterais, podemos destacar: sono, farmacodependência, depressão respiratória, miose, aumento do tônus da musculatura gastrointestinal e redução de seus movimentos, ver quadro 17.

Medicamento (nome comercial)	Dose (mg)	Forma farmacêutica	Intervalo de administração	Tempo de uso (média)
Doloxene A	50	comprimidos	4/4 h	24 h
Tylex	30	comprimidos	4/4 h	24 h
Sylador	50	comprimidos	8/8 h	24 h
Dorless	50	comprimidos	8/8 h	24 h
Codaten	50	comprimidos	8/8 h	24 h

Quadro 17: associações de analgésicos
Fonte: Do autor (Rodrigues Filho, 2010)