

Quando devemos investigar gravidez antes da reaplicação de medroxiprogesterona trimestral injetável?

Embora os fabricantes da medroxiprogesterona trimestral injetável recomendem como prazo máximo para reaplicação o intervalo de três meses (13 semanas), as evidências disponíveis apontam para segurança anticoncepcional com uso em intervalos de até três meses e 14 dias (15 semanas) sem a necessidade de investigar gravidez.

Se o intervalo de aplicação exceder 15 semanas, é importante descartar gestação nas mulheres que tiveram relações sexuais desprotegidas, com teste de gravidez sérico ou teste rápido. Nesses casos, após afastada gestação, orienta-se realizar a injeção e indicar o uso de método de barreira associado (camisinha) nos primeiros 7 dias.

A medroxiprogesterona também pode ser aplicada antes da data aprazada (13 semanas), caso seja mais conveniente para a paciente.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Formulário terapêutico nacional 2010**: Rename 2010. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. **Protocolos da Atenção Básica**: Saúde das mulheres [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf.

Área temática: Saúde da Mulher

Descritores: Anticoncepcionais Orais Sintéticos; Medroxiprogesterona

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde sexual e saúde reprodutiva** [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Cadernos de Atenção Básica, n. 26).

CURTIS, K. M. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2016 [Internet]. **MMWR Recomm Rep**, Atlanta, v. 65, n. 4, p. 1-66, 2016. Disponível em: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/rr6504a1.htm>. Acesso em: 13 set. 2017.

DEMEDROX®. **Acetato de medroxiprogesterona**. Embu-Guaçu, SP: União Química Farmacêutica Nacional, 2016. Bula de remédio. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=25057992016&pIdAnexo=4030528.

DEPO® PROVERA®. **Puurs**, Bélgica: Pfizer Manufacturing Belgium N.V., 2017. Bula de remédio. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=18089592017&pIdAnexo=9104248. Acesso em: 13 set. 2017.

KAUNITZ, A. M. **Depot medroxyprogesterone acetate for contraception** [Internet]. Waltham (MA): UpToDate, 2016. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/depot-medroxyprogesterone-acetate-for-contraception>. Acesso em: 13 set. 2017.

STEINER, M. J. et al. **Injectable contraception**: what should the longest interval be for reinjections? **Contraception**, Los Altos, CA, v. 77, n. 6, p. 410-414, 2008.